

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA

Witagin®
tabletki

Działanie:

Korzeń żeń-szenia wykazuje działanie stymulujące na OUN.

Witaminy i mikroelementy zawarte w preparacie uzupełniają niedobory tych związków powstałe z różnych przyczyn (niedożywienie, niewłaściwa dieta, zaburzenia wchłaniania, czy zwiększone zapotrzebowanie).

Wskazania do stosowania:

Tradycyjnie jako lek wspomagający:

- w stanach zmęczenia i wyczerpania fizycznego,
- w okresie rekonwalescencji.

Ponadto preparat uzupełnia niedobory witamin i mikroelementów związane z niewłaściwą dietą, utrudnionym wchłanianiem, zwiększonym zapotrzebowaniem.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku u chorych z nadwrażliwością na składniki leku, z zaburzeniami metabolizmu wapnia, upośledzoną czynnością nerek, podczas stosowania innych leków z witaminą A i D₃, bądź diety zawierającej wysokie dawki tych witamin, terapii retinoidami (w leczeniu trądziku).

Środki ostrożności związane ze stosowaniem:

Możliwość stosowania leku w przypadku cukrzycy, bądź stosowania leków z warfaryną należy skonsultować z lekarzem.

Jeżeli objawy nie ustąpią w czasie stosowania produktu, należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji:

Wyciąg z żeń-szenia może nieznacznie obniżać poziom glukozy we krwi oraz powodować interakcje z warfaryną.

Ostrzeżenia specjalne:

Stosowanie leku u dzieci:

Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 14 roku życia.

Ciąża i karmienie piersią:

Z uwagi na zawartość w preparacie witaminy A, nie należy stosować leku w czasie ciąży lub przed planowanym zajściem w ciążę bez konsultacji z lekarzem.

Ze względu na możliwość przechodzenia do mleka matki licznych składników leku, nie stosować w okresie laktacji.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Nie ma wpływu.

Dawkowanie, sposób podawania i droga podania:

Doustnie, 1-2 tabletki dziennie (najlepiej rano i w południe podczas posiłku) przez 3 tygodnie, następnie 1 tabletkę rano.

Kurację kontynuować przez 2 miesiące, po czym wskazany jest 1 miesiąc przerwy.

Przedawkowanie:

Nadużywanie powoduje tzw. „zespół żeń-szeniowy”, objawiający się bezsennością, nadciśnieniem, wysypką skórą. Przy znacznym przekroczeniu dawek (10-15 tabletek) mogą wystąpić objawy przedawkowania witaminami A i D₃.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane:

Sporadycznie mogą wystąpić zaburzenia ze strony układu pokarmowego (wzdęcia, uczucie pełności, nudności), niepokój oraz trudności w zasypianiu.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywanie leku:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.

Skład leku:

wyciąg suchy z korzenia żeń-szenia (*Ginseng radidis extractum siccum*), wyciąg natywny (2,5-5:1) 90-99% o zawartości 16,0-22,8% ginsenozydów, odwodniony syrop glukozowy 1-10%, ekstrahent - etanol 70% (v/v) - 60,0 mg

premijs witaminowy 994 EU - 200 mg:

witamina B ₁ (<i>Thiaminum</i>)	1,4 mg
witamina B ₂ (<i>Riboflavinum</i>)	1,6 mg
witamina B ₆ (<i>Pyridoxinum</i>)	2,0 mg
witamina B ₁₂ (<i>Cyanocobalaminum</i>)	1,0 µg
witamina C (<i>Acidum ascorbicum</i>)	60 mg
witamina E (<i>Tocopherolum</i>)	10 mg
witamina PP (<i>Nicotinamidum</i>)	18 mg
kwas pantotenowy (<i>Acidum Pantothenatum</i>)	6,0 mg
biotyna (<i>Biotinum</i>)	150 µg
kwas foliowy (<i>Acidum folicum</i>)	200 µg

premijs witaminowy A+D₃ (500/50) - 4 mg:

witamina A (<i>Retinolum</i>)	602,4 µg (2008 IU)
witamina D ₃ (<i>Cholecalciferolum</i>)	5 µg (200 IU)

premijs soli mineralnych 05/OH/07 - 39,354 mg:

żelazo (<i>Ferrum</i>)	8,0 mg
cynk (<i>Zincum</i>)	7,0 mg
mangan (<i>Manganum</i>)	1,2 mg
chrom (<i>Chromium</i>)	30 µg
miedź (<i>Cuprum</i>)	0,64 mg

magnez (*Magnesium*) - 150,0 mg

selen (*Selenium*) - 60 µg

Substancje pomocnicze: magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna. Substancje pomocnicze premiks witaminowego A+D₃ (500/50): butylohydroksytoluen, żelatyna wieprzowa, sacharoza, skrobia kukurydziana. Substancje pomocnicze premiks witaminowego 994 EU: maltodekstryna, kwas cytrynowy, sodu cytrynian, modyfikowana skrobia spożywcza, krzemionka koloidalna bezwodna. Jedna tabletki zawiera 8,5-15 mg ginsenozydów w przeliczeniu na ginsenozyd R_{b1}.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Labofarm sp. z o.o.

ul. Lubichowska 176B

83-200 Starogard Gdański

tel. 58 561 20 08

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: