

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tonsillopas

Krople doustne, roztwór

Homeopatyczny lek ze wskazaniami leczniczymi

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Tonsillopas i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tonsillopas
3. Jak stosować lek Tonsillopas
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Tonsillopas
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tonsillopas i w jakim celu się go stosuje

Tonsillopas jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych gardła.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tonsillopas

Kiedy nie stosować leku Tonsillopas

- jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek z substancji czynnych lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
- w chorobie alkoholowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tonsillopas należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli objawy utrzymują się przez dłuższy czas, nie nastąpi poprawa lub objawy nasilą się lub wystąpią inne, niejasne dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku gorączki utrzymującej się dłużej niż 3 dni lub wynoszącej ponad 39°C należy skonsultować się z lekarzem.

Z powodu braku wystarczających danych dotyczących stosowania u dzieci, nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Decyzje o stosowaniu tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat powinien podjąć lekarz pediatra.

Lek Tonsillopas zawiera 25% (V/V) alkoholu.

Ten lek zawiera 30 mg alkoholu (etanolu) w każdej pojedynczej dawce - 5 kroplach (25% V/V). Ilość alkoholu w dawce tego leku jest równoważna mniej niż 1 ml piwa lub 1 ml wina.

Nie stosować u osób uzależnionych od alkoholu, zachować ostrożność u osób z padaczką lub chorobami wątroby.

Lek Tonsillopas a inne leki

Nie są znane interakcje z innymi lekami, jednak w razie przyjmowania innych leków należy skonsultować się z lekarzem.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.

Stosowanie leku Tonsillopas z jedzeniem, piciem i alkoholem

Na działanie leków homeopatycznych mogą wpływać negatywnie: używki, alkohol, palenie tytoniu i produkty zawierające miętę.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i laktacji. Nie zaleca się stosowania w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek zawiera 25% (V/V) alkoholu i może wywierać niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn, zwłaszcza jeśli będzie przyjmowany w początkowej fazie choroby z dużą częstotliwością. Po przyjęciu leku alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w powietrzu wydychanym.

3. Jak stosować lek Tonsillopas

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Jeśli nie zalecono inaczej:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

W początkowej fazie choroby, przy nasilonych dolegliwościach: 5 kropli doustnie co pół godziny lub co godzinę, jednak nie częściej niż 6 razy na dobę.

Po częściowym ustąpieniu objawów należy ograniczyć częstość stosowania do 3 razy na dobę.

W chorobach przewlekłych: 5 kropli doustnie 1-3 razy na dobę.

Dla młodzieży powyżej 12 lat i dla dorosłych maksymalna dawka dobową nie powinna przekraczać 30 kropli.

Ponieważ lek Tonsillopas zawiera *Baptisia tinctoria* zawierającą toksyczne alkaloidy chinolizydynowe, nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Jeśli jednak lekarz zdecyduje inaczej, maksymalna dawka dobową nie powinna przekraczać 20 kropli.

Czas stosowania:

Bez zalecenia lekarza nie stosować leku przez okres dłuższy niż jeden tydzień.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tonsillopas

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty i pokazać opakowanie leku oraz, jeśli to możliwe pozostałe krople.

Pominięcie przyjęcia leku Tonsillopas

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Tonsillopas

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje skórne, należy wówczas przerwać stosowanie leku.

W wyniku przyjmowania leku Tonsillopas może dojść do wzmożonego wydzielania śliny. W takim przypadku należy przerwać jego stosowanie.

Podczas przyjmowania leku homeopatycznego może dojść do przejściowego pogorszenia się istniejących dolegliwości (początkowe pogorszenie). W takim przypadku należy odstawić lek i skonsultować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tonsillopas

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Tonsillopas po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Warunki przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tonsillopas

10 g roztworu (co odpowiada 10,3 ml) zawiera substancje czynne:

Baptisia D1	1 g
Hydrargyrum bicianatum. D8	4 g
Ammonium bromatum D4	1 g
Kalium bichromicum D4	1 g
Kalium chloratum D2	1 g
Apisinum D6	2 g

Lek zawiera 25% (V/V) etanolu.

Jak wygląda lek Tonsillopas i co zawiera opakowanie

Butelka z barwnego szkła z kropłomierzem, zawierająca 20 ml lub 50 ml leku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Pascoe Pharmazeutische Präparate GmbH

Schiffenberger Weg 55

D- 35394 Giessen

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Imis Pharma s.c.
ul. Św. Bonifacego 66/47
02-936 Warszawa
Tel. + 48 698 744 600
e-mail: office@imispharma.eu

Data ostatniej aktualizacji ulotki: